


平成20年2月

京都市こどもの感染症

かんせんしょう



★☆ これから流行りそうなのは…

< 去年の今頃(2月)の順位 >

順位	病気の名前	特徴, 予防法など
1位	インフルエンザ	インフルエンザウイルスが原因で、急な発熱(高熱)や筋肉痛、関節痛などの全身症状が強く出やすく、免疫力の弱い乳幼児では、吐き気や嘔吐などの胃腸症状のほか、肺炎や気管支炎、中耳炎、脳炎などの合併症を起こすこともあります。 予防策としては、インフルエンザのワクチン接種のほか、手洗い・うがい・マスクをし、部屋の湿度を適切に保つ、休養、栄養を摂るなどの日々の対策も大切です。
2位	感染性胃腸炎 <small>かんせんせいりょうえん</small>	発熱、下痢、嘔吐などが症状。ノロウイルスが有名ですが、その他の色々なウイルスや細菌も原因となり、何回もかかってしまうことがあります。予防のため、調理前、食事前、トイレの後などの手洗いや、食品の十分な加熱などを心がけましょう。
3位	水ぼうそう (水痘)	水痘ウイルスが原因で、全身に発しんができます。伝染力が強く、肺炎・脳炎・髄膜炎などの合併症を併発することもあります。 発病3日以内に抗ウイルス薬を服用することで、症状の軽減が期待できます。予防接種は任意(1歳以上で、1回接種)ですが、集団生活をする場合は、受けておかれることをおすすめします。かかりつけの医療機関にご相談ください。 なお、集団へ感染がひろがるのを防止するため、学校保健法による出席停止期間は、 <u>すべての発しんが、かさぶたになるまで</u> となっています。

●●● 小学校入学準備に2回目(第2期)の麻しん・風しんワクチンを! ●●●

(※) 平成19年度の第2期の対象者は、平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの人です。

平成18年4月1日以降、麻しん・風しん混合生ワクチン(MRワクチン)の2回定期接種が開始となりました。対象者は、第1期が1歳児、第2期が5~7歳未満で、小学校入学前の1年間の者(※)です。第2期で、まだ麻しんと風しんの予防接種をそれぞれ2回ずつ受けていないお子様がおられましたら、かかりつけの医師と相談し、平成20年3月31日までに受けましょう!

接種医療機関につきましては、最寄りの保健所にお尋ねください。

3/31
までに済ませ
ましょう!

なぜ2回接種なの?

- 理由その1
1 1回の接種で免疫がつかなかった子どもたち(数%存在するとかんがえられます)に免疫を与えます。
- 理由その2
2 1回目の接種では免疫がついたものの、その後時間が経つにつれ免疫が少しずつ減少した子どもたちに、再び刺激を与え、免疫を強固なものにします。
- 理由その3
3 1回目に接種できなかった子どもたちにも、もう一度、接種のチャンスがあります。



◆ 気になる症状があるときは、かかりつけの医療機関に相談しましょう!

発行/京都市保健福祉局
地域医療課、衛生公害研究所
(ホームページにも掲載しています。)