


平成20年3月

京都市こどもの感染症

かんせんしょう



★ ☆ **これから流行りそうなものは…**

< 去年の今頃(3月)の順位 >

順位	病気の名前	特徴, 予防法など
1位	インフルエンザ	インフルエンザウイルスが原因で、急な発熱(高熱)や筋肉痛、関節痛などの全身症状が強く出やすく、免疫力の弱い乳幼児では、吐き気や嘔吐などの胃腸症状のほか、肺炎や気管支炎、中耳炎、脳炎などの合併症を起こすこともあります。 予防には、手洗い・うがい・マスクをし、部屋の湿度を適切に保つ、休養、栄養を摂るなどの日々の対策が大切です。
2位	感染性胃腸炎 <small>かんせんせいいちょうえん</small>	発熱、下痢、嘔吐などが症状。ノロウイルスが有名ですが、その他の色々なウイルスや細菌も原因となり、何回もかかってしまうことがあります。予防のため、調理前、食事前、トイレの後などの手洗いや、食品の十分な加熱などを心がけましょう。
3位	水ぼうそう (水痘)	水痘ウイルスが原因で、全身に発しんができます。伝染力が強く、肺炎・脳炎・髄膜炎などの合併症を併発することもあります。 発病3日以内に抗ウイルス薬を服用することで、症状の軽減が期待できます。 予防接種は任意(1歳以上で、1回接種)ですが、集団生活をする場合は、受けておかれることをおすすめします。かかりつけの医療機関にご相談ください。 なお、集団へ感染がひろがるのを防止するため、学校保健法による出席停止期間は、すべての発しんが、かさぶたになるまでとなっています。

子どもたちを様々な感染症から守るために大切な
●●● 定期予防接種を受けましょう! ●●●

★ 京都市が行っている定期予防接種には、集団接種と個別接種があります。

【集団接種】 (保健所で集団で実施します。接種日は、保健所からハガキ等で通知します。)

	接種対象年齢	接種回数	料金	
●ポリオ	生後3月～7歳6ヶ月	2回	無料	京都市では、ポリオは4月と10月に行っています。 ↑ 来月だよ!
●BCG	生後3月～6月末満	1回	無料	

【個別接種】 (予防接種協力医療機関に事前に予約をし、個人で受けます。)

	接種対象年齢	接種回数	料金
●DPT (ジフテリア、百日せき、破傷風)	第1期 生後3月～7歳6ヶ月	3～8週間おきに3回、 その後、1～1年半後に追加を1回	無料
●DT (ジフテリア、破傷風)	第2期 11歳～13歳未満	1回	
●MR (麻しん、風しん)	第1期 1歳児 第2期 5歳～7歳未満*	1回 1回	無料
●日本脳炎	現在、厚生労働省の勧告により、積極的勧奨が差し控えられています。		

* 個別接種の場合、最寄りの予防接種協力医療機関に事前に連絡し、予約を行ってください。
予防接種協力医療機関の問い合わせ先などは、最寄りの保健所におたずねください。

◆ 気になる症状があるときは、かかりつけの医療機関に相談しましょう!

発行/京都市保健福祉局
地域医療課、衛生公害研究所
(ホームページにも掲載しています。)