

平成25年2月

京都市こどもの感染症

家庭で できる

ノロウイルスの消毒法

ノロウイルスによる感染性胃腸炎の主な症状に、激しいおう吐と下痢があります。感染者のおう吐物や便には、大量のウイルスが含まれます。適切な消毒をして、感染が広がるのを予防しましょう。

注意

おう吐物が乾燥するとウイルスが空中に漂います。乾燥する前に処理しましょう。

準備



- ① **マスク・ゴム手袋**をつけます。
- ② 消毒液、ペーパータオル、雑巾、ビニール袋などを用意します。

消毒

注意

ウイルスが飛び散るので静かに！

① 床等のおう吐物は、**濃い消毒液**を浸したペーパータオルなどで覆い、**周囲から内側に静かに**拭き取ります。

② さらに**薄い消毒液**で浸すように拭き取り、10分後水拭きします。

おう吐物等で汚れた衣類やリネン類は、薄い消毒液に30~60分つけて消毒後、洗濯します。

消毒液が使えないものの消毒は？

色柄物の衣類など
煮沸消毒(85℃で1分間以上加熱)します。

ふとんやカーペット
スチームアイロンで高熱にさらします。



処理

① 汚物やマスク、手袋、雑巾は、ビニール袋に入れ**密閉して**捨てます。

② 処理の後の室内は、十分に換気してください。

消毒液(次亜塩素酸ナトリウム消毒液)はペットボトルで簡単につくれます
台所用塩素系漂白剤(5%)を原液とした場合

★濃い消毒液(0.1%)

(おう吐物などが付いたものの消毒用)
500mlのペットボトルに水を入れ、**キャップ2杯(10ml)**の漂白剤を加えます。ふたをしてよく振ってから使用します。



★薄い消毒液(0.02%)

(手で触れるものなどの消毒用)
バケツに**2L**の水を入れ、**キャップ2杯(10ml)**の漂白剤を加えます。

※ 漂白剤は使用上の注意をよく読んでから使用してください。

※ 色柄物は、色落ちするので注意してください。

※ 金属に使用すると錆びる場合がありますので、消毒後、水拭きしてください。

※ 誤飲しないよう取り扱いに注意してください。

◆「京都市こどもの感染症」に関するお問い合わせ

○お近くの保健センター

○京都市保健福祉局 保健医療課 (TEL:075-222-4421 FAX:075-222-3416)

○京都市衛生環境研究所 管理課 (TEL:075-312-4942 FAX:075-311-3232)



京都市印刷物 第244782号

平成25年2月 発行

京都市衛生環境研究所

衛生環境研究所のホームページからもご覧になれます