

◆ 今週のコメント (感染地域、感染経路については推定を含みます。)

- ・ レジオネラ症(肺炎型)の報告が2例(50歳代男性および70歳代男性)あります。本年の累積報告数は15例となっています。
- ・ アメーバ赤痢の報告が1例(40歳代男性)(第41週追加報告分)あり、症状は下痢・腹痛・発熱・肝膿瘍です。感染地域は国内、感染経路は性的接触です。本年の累積報告数は16例となりました。
- ・ 梅毒の報告が2例(20歳代女性および20歳代男性)(共に第41週追加報告分)あり、症状は硬性下疳です。感染地域は国内、感染経路は性的接触です。本年の累積報告数は59例となりました。

京都市では、平日昼間、土日及び夜間にHIV・性感染症(梅毒・淋菌・クラミジア)検査を実施しています。詳細については、下記のホームページを御覧ください。

○京都市情報館「京都市のHIV検査について(平成29年度から検査体制を変更しました。)」

<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000047908.html>

◆ 今週のトピックス: <レジオネラ>

京都市におけるレジオネラ症の報告が2例(50歳代男性および70歳代男性)あり、本年の累積報告数は15例(男性11例、女性4例)となっています。詳細をトピックスに掲載しています。

◆ 発生状況

全数把握の感染症

- ・ 二類:結核 9例(肺結核 6例, その他結核 3例)うち喀痰塗抹陽性 3例
【1月以降の累積報告数 281例(肺結核 145例, その他結核 48例, 潜在性結核感染者 88例)うち喀痰塗抹陽性 70例】
- ・ 四類:レジオネラ症(肺炎型) 2例【1月以降の累積報告数 15例】
- ・ 五類:アメーバ赤痢 1例(腸管及び腸管外アメーバ症)【1月以降の累積報告数 16例】
- ・ 五類:梅毒 2例【1月以降の累積報告数 59例】

定点把握の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点69, 小児科定点43, 眼科定点10, 基幹定点1)

| 定点 | 感染症名 | 定点当たり報告数 | 報告数 |
|-----------------|-----------------|----------|-----|
| インフルエンザ* | インフルエンザ | 0. 22 | 15 |
| 小児科 (降順5位まで) | ① 感染性胃腸炎 | 3. 95 | 170 |
| | ② 手足口病 | 1. 95 | 84 |
| | ③ ヘルパンギーナ | 0. 98 | 42 |
| | ④ RSウイルス感染症 | 0. 95 | 41 |
| | ⑤ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0. 81 | 35 |
| 眼科 | 流行性角結膜炎 | 0. 10 | 1 |

【次ページ以降の主な内容】

発生状況の概況グラフ / 今週のトピックス:<レジオネラ>













付表(疾病, 行政区別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数)

(注)京都市のデータは、平成29年10月25日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

また、本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

* 感染経路及び感染地域については推定を含みます。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（平成29年）



第42週(10月16日～10月22日)トピックス: <レジオネラ症>

京都市及び全国の発生動向

京都市におけるレジオネラ症の報告が2例(50歳代男性および70歳代男性)あり、本年の累積報告数は15例(男性11例、女性4例)となっています(表1)。報告数は平成24年以降増加傾向にあり、平成24年～平成29年第42週までの累積報告数は91例、性別では男性71例(78.0%)、女性20例(22.0%)となっており、男性が大半を占めています(表1)。全国の報告数も本市と同様に年々増加しており、本年は第42週時点で1,400例を超えています。また、性別でも男女比が約4:1と本市と同様の傾向となっています(図1)。性差が大きいのは、はっきりした原因は判っていませんが、レジオネラ症のハイリスク・グループとされる大酒家、重喫煙者などは男性が多いこと、仕事で下記の感染源に曝露される作業員が男性に偏っていることも影響していると言われてしています。年齢階級別では、男性は60～70歳代にピークがあり、女性は70歳代以降の報告が多く見られます(図2)。免疫力、抵抗力が低くなると感染しやすいため高齢者の感染が多くなっています。

感染源

レジオネラ症は、レジオネラ属菌を含むエアロゾルや塵埃を吸入することにより発症する細菌感染症で、感染源となる設備に24時間風呂などの循環式浴槽、冷却塔、給湯設備、加湿器、噴水などがあります。特にこれらの設備の配管内部の「ぬめり」がレジオネラ属菌を含め細菌の温床となります。近年、設備導入が進んでいるために発生数が増加しているとみられており、「現代病」の1つとも言われています。

症状

レジオネラ症には、劇症型のレジオネラ肺炎と一過性のポンティアック熱の2つの病型があります。劇症型のレジオネラ肺炎の潜伏期間は2～10日です。全身倦怠感、頭痛、筋肉痛などの症状に始まり、乾いた咳、痰、高熱、悪寒、胸痛、呼吸困難が見られるようになります。傾眠、昏睡、幻覚、四肢の振せんなどの中枢神経系の症状や下痢を伴うことがあり、適切な治療が行われなければ死亡する可能性もあります。ポンティアック熱は、潜伏期間が1～2日で、突然の発熱、悪寒、筋肉痛で始まりますが、一過性で治癒します。

表1 京都市の年次別、性別報告数の推移

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 (～第42週) | 合計 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|----|
| 男性 | 7 | 4 | 14 | 22 | 13 | 11 | 71 |
| 女性 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 20 |
| 合計 | 7 | 8 | 16 | 28 | 17 | 15 | 91 |

図1 全国の報告数の推移





図2 全国の性別、年齢階級別報告数(平成24年～平成29年第42週まで)



T3201

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成29年第42週

疾病,行政区別報告数

平成29年10月16日～平成29年10月22日

データ入手日:平成29年10月25日

| | インフルエンザ (※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎(※2) | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎(※3) | 感染性胃腸炎(※4) |
|------|-----------------|-----------|-------|-------------------|--------|----|------|-------|--------|-----|---------|---------|----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|------------|
| 男女合計 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 北 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 上京 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 左京 | - | 4 | - | 4 | 42 | 1 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中京 | - | - | - | 4 | 8 | - | 5 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東山 | 2 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山科 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 下京 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | 5 | - | 1 | 15 | 1 | 9 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 右京 | 5 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 14 | - | 1 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伏見 | 4 | 11 | 1 | 10 | 67 | 12 | 29 | - | 7 | - | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 西京 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | - | 22 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都市計 | 15 | 41 | 9 | 35 | 170 | 18 | 84 | - | 18 | - | 42 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - |

疾病,行政区別定点当たり報告数

| | インフルエンザ (※1) | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎(※2) | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎(※3) | 感染性胃腸炎(※4) |
|------|-----------------|-----------|-------|-------------------|--------|------|------|-------|--------|-----|---------|---------|----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|------------|
| 男女合計 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
| 北 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
| 上京 | 0.20 | 0.33 | - | 0.67 | - | 0.33 | 0.33 | - | - | - | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 左京 | - | 1.00 | - | 1.00 | 10.50 | 0.25 | 1.00 | - | 0.25 | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中京 | - | - | - | 1.33 | 2.67 | - | 1.67 | - | 0.33 | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東山 | 0.67 | 2.50 | - | - | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山科 | - | 0.60 | 0.40 | 0.40 | - | - | - | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 下京 | 0.33 | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | 1.67 | - | 0.33 | 5.00 | 0.33 | 3.00 | - | 0.33 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 右京 | 0.63 | 2.20 | 0.60 | 1.40 | 2.20 | 0.60 | 2.80 | - | 0.20 | - | 1.40 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伏見 | 0.36 | 1.57 | 0.14 | 1.43 | 9.57 | 1.71 | 4.14 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 西京 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 3.80 | - | 4.40 | - | 0.80 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都市計 | 0.22 | 0.95 | 0.21 | 0.81 | 3.95 | 0.42 | 1.95 | - | 0.42 | - | 0.98 | 0.12 | - | 0.10 | - | - | - | - | - |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成29年第42週

年齢階級, 疾病別報告数

平成29年10月16日～平成29年10月22日

データ入手日:平成29年10月25日

| 京都市 | 年齢1 年齢2 年齢3 年齢4 | 総数 総数 総数 総数 | ～5ヶ月 ～5ヶ月 ～5ヶ月 0歳 | ～11ヶ月 ～11ヶ月 ～11ヶ月 1歳- | 1歳 1歳 1歳 5歳- | 2歳 2歳 2歳 10歳- | 3歳 3歳 3歳 15歳- | 4歳 4歳 4歳 20歳- | 5歳 5歳 5歳 25歳- | 6歳 6歳 6歳 30歳- | 7歳 7歳 7歳 35歳- | 8歳 8歳 8歳 40歳- | 9歳 9歳 9歳 45歳- | 10歳- 10歳- 10歳- 50歳- | 15歳- 15歳- 15歳- 55歳- | 20歳- 20歳- 20歳以上 60歳- | 30歳- 30歳- 30歳- 65歳- | 40歳- 40歳- 40歳- 70歳以上 | 50歳- 50歳- 50歳- 70歳以上 | 60歳- 60歳- 60歳- 70歳以上 | 70歳- 70歳- 70歳以上 70歳以上 | 80歳以上 |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|
| インフルエンザ (※1) | 年齢1 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| RSウイルス感染症 | 年齢3 | 41 | 5 | 9 | 17 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 咽頭結膜熱 | | 9 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 35 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎 | | 170 | 1 | 21 | 28 | 22 | 16 | 12 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 17 | 5 | 21 | - | - | - | - | - | |
| 水痘 | | 18 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 手足口病 | | 84 | 3 | 7 | 41 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伝染性紅斑 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 突発性発しん | | 18 | - | 4 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 百日咳 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | | 42 | - | 1 | 18 | 9 | - | 6 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 急性出血性結膜炎 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 細菌性髄膜炎 (※2) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| クラミジア肺炎 (※3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 感染性胃腸炎 (※4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

年齢階級, 疾病別定点当り報告数

| 京都市 | 年齢1 年齢2 年齢3 年齢4 | 総数 総数 総数 総数 | ～5ヶ月 ～5ヶ月 ～5ヶ月 0歳 | ～11ヶ月 ～11ヶ月 ～11ヶ月 1歳- | 1歳 1歳 1歳 5歳- | 2歳 2歳 2歳 10歳- | 3歳 3歳 3歳 15歳- | 4歳 4歳 4歳 20歳- | 5歳 5歳 5歳 25歳- | 6歳 6歳 6歳 30歳- | 7歳 7歳 7歳 35歳- | 8歳 8歳 8歳 40歳- | 9歳 9歳 9歳 45歳- | 10歳- 10歳- 10歳- 50歳- | 15歳- 15歳- 15歳- 55歳- | 20歳- 20歳- 20歳以上 60歳- | 30歳- 30歳- 30歳- 65歳- | 40歳- 40歳- 40歳- 70歳以上 | 50歳- 50歳- 50歳- 70歳以上 | 60歳- 60歳- 60歳- 70歳以上 | 70歳- 70歳- 70歳以上 70歳以上 | 80歳以上 |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|
| インフルエンザ (※1) | 年齢1 | 0.22 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | |
| RSウイルス感染症 | 年齢3 | 0.95 | 0.12 | 0.21 | 0.40 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 咽頭結膜熱 | | 0.21 | - | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 0.81 | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | - | 0.05 | - | - | - | - | | |
| 感染性胃腸炎 | | 3.95 | 0.02 | 0.49 | 0.65 | 0.51 | 0.37 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.40 | 0.12 | 0.49 | - | - | - | - | | |
| 水痘 | | 0.42 | - | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 手足口病 | | 1.95 | 0.07 | 0.16 | 0.95 | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 伝染性紅斑 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 突発性発しん | | 0.42 | - | 0.09 | 0.28 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 百日咳 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ヘルパンギーナ | | 0.98 | - | 0.02 | 0.42 | 0.21 | - | 0.14 | 0.05 | 0.02 | - | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.05 | - | - | - | - | | |
| 流行性耳下腺炎 | | 0.12 | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | | |
| 急性出血性結膜炎 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 流行性角結膜炎 | | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | | |
| 細菌性髄膜炎 (※2) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| クラミジア肺炎 (※3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 感染性胃腸炎 (※4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:平成29年第42週

週, 疾病別報告数

データ入手日:平成29年10月25日

| 京都市 | 男女合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| インフルエンザ ※1) | | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 | 15 |
| RSウイルス感染症 | | 121 | 79 | 91 | 76 | 62 | 41 |
| 咽頭結膜熱 | | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 48 | 29 | 45 | 37 | 38 | 35 |
| 感染性胃腸炎 | | 146 | 151 | 158 | 228 | 161 | 170 |
| 水痘 | | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 18 |
| 手足口病 | | 50 | 40 | 43 | 37 | 50 | 84 |
| 伝染性紅斑 | | - | - | 1 | - | - | - |
| 突発性発しん | | 19 | 12 | 11 | 15 | 17 | 18 |
| 百日咳 | | - | - | - | 1 | - | - |
| ヘルパンギーナ | | 53 | 48 | 45 | 38 | 32 | 42 |
| 流行性耳下腺炎 | | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 急性出血性結膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 細菌性髄膜炎 ※2) | | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 ※3) | | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 ※4) | | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | | 466 | 379 | 425 | 466 | 405 | 438 |

週, 疾病別定点当たり報告数

| 京都市 | 男女合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---------------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| インフルエンザ ※1) | | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.32 | 0.22 |
| RSウイルス感染症 | | 2.81 | 1.84 | 2.12 | 1.77 | 1.44 | 0.95 |
| 咽頭結膜熱 | | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 1.12 | 0.67 | 1.05 | 0.86 | 0.88 | 0.81 |
| 感染性胃腸炎 | | 3.40 | 3.51 | 3.67 | 5.30 | 3.74 | 3.95 |
| 水痘 | | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.42 |
| 手足口病 | | 1.16 | 0.93 | 1.00 | 0.86 | 1.16 | 1.95 |
| 伝染性紅斑 | | - | - | 0.02 | - | - | - |
| 突発性発しん | | 0.44 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.42 |
| 百日咳 | | - | - | - | 0.02 | - | - |
| ヘルパンギーナ | | 1.23 | 1.12 | 1.05 | 0.88 | 0.74 | 0.98 |
| 流行性耳下腺炎 | | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| 急性出血性結膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
| 細菌性髄膜炎 ※2) | | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 ※3) | | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 ※4) | | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | | 11.43 | 9.27 | 10.21 | 11.07 | 9.38 | 10.13 |

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。