(イ) 咽頭結膜熱

平成30年は年間報告数493例、年間定点当たり報告数11.47、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.65、前年比0.65であった。

月別定点当たり報告数では6月(2.05)、5月(1.72)及び12月(1.70)が多かった。

年齢階級別では1歳(27.6%)が最も多く、次いで2歳(18.3%)、3歳(14.0%)の順となり、1～3歳以下が全体の59.9%を占めた。

週別定点当たり報告数の推移

年次別年間定点当たり報告数

月別定点当たり報告数

年次別・年齢階級別定点当たり報告数の割合

(ウ) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

平成30年は年間報告数2,577例、年間定点当たり報告数59.93、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比1.03、前年比0.90であった。

過去10年間の年間定点当たり報告数は平成29年、27年、24年に次いで4番目に多かった。

月別定点当たり報告数では、6月(6.95)、7月(6.28)、5月(5.91)の順に多かった。

年齢階級別では、5歳(13.5%)が最も多く、6歳(12.5%)、4歳(11.8%)、7歳(10.7%)の順となり、4歳～7歳が48.5%を占めた。

週別定点当たり報告数の推移

年次別年間定点当たり報告数

月別定点当たり報告数

年次別・年齢階級別定点当たり報告数の割合

(エ) 感染性胃腸炎

平成30年は年間報告数12,190例、年間定点当たり報告数283.49、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.92、前年比0.97であった。

月別定点当たり報告数では5月(32.40)、6月及び12月(30.86)の順に多かった。

年齢階級別では、1歳(14.5%)が最も多く、次いで2歳(11.4%)、20歳以上(10.5%)であった。

週別定点当たり報告数の推移

年次別年間定点当たり報告数

月別定点当たり報告数

年次別・年齢階級別定点当たり報告数の割合

(オ) 水痘

平成30年は年間報告数522例、年間定点当たり報告数12.14、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.49、前年比0.98であった。

年間定点当たり報告数が平成25年から連続して減少し、過去10年間で最少となった。

月別定点当たり報告数では、12月(2.30)、11月(1.42)、5月(1.16)の順に多かった。

年齢階級別では、4歳(14.4%)に次いで、5歳(13.6%)、6歳(13.0%)、7歳(10.5%)の順に多く、4～7歳が全体の51.5%を占め、3歳以下の割合は年々減少している。

週別定点当たり報告数の推移

年次別年間定点当たり報告数

月別定点当たり報告数

年次別・年齢階級別定点当たり報告数の割合

(カ) 手足口病

平成30年は年間報告数が1,364例、年間定点当たり報告数は31.72、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.47、前年比0.35であった。

過去10年間の年間定点当たり報告数をみると、ほぼ隔年で増減を繰り返しており、平成30年は少ない年であった。

月別定点当たり報告数は、7月(12.14)、9月(4.35)、8月(4.12)の順に多く、2月～4月の報告数は少なかった。

年齢階級別では、1歳(32.8%)が最も多く、次いで2歳(25.7%)、3歳(11.7%)となり、1歳～3歳が全体の70.2%を占めた。

(キ) 伝染性紅斑

平成30年は年間報告数195例、年間定点当たり報告数4.53、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.67、前年比3.36であった。第48週以降、報告数が急増した。

月別定点当たり報告数では、12月(1.98)が最も多く、次いで11月(0.93)、10月(0.44)の順に多かった。

年齢階級別では、4歳(21.0%)が最も多く、次いで5歳(15.9%)、6歳(9.7%)の順であった。

週別定点当たり報告数の推移

年次別年間定点当たり報告数

月別定点当たり報告数

年次別・年齢階級別定点当たり報告数の割合

(ウ) 突発性発しん

平成30年は年間報告数787例、年間定点当たり報告数18.3、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.95、前年比0.94であった。

過去10年間の年間定点当たり報告数は横ばい傾向で、平成30年は最も少なかったものの、平均値(19.36)をやや下回る程度であった。

月別定点当たり報告数では、4月(2.28)が最も多く、次いで7月(2.21)、5月(2.09)の順に多かった。

年齢階級別では、1歳(51.8%)が半数以上を占め、次いで6箇月～11箇月(32.7%)の順で、1歳以下が全体の85.5%を占めた。

週別定点当たり報告数の推移

年次別年間定点当たり報告数

月別定点当たり報告数

年次別・年齢階級別定点当たり報告数の割合

(ケ) ヘルパンギーナ

平成30年は年間報告数947例、年間定点当たり報告数22.02、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.88、前年比0.93であった。

過去10年間の年間定点当たり報告数と比べると中央値(22.15)に近かった。

月別定点当たり報告数では、7月(8.47)、8月(4.16)、9月(2.93)の順であった。

年齢階級別では、1歳(33.4%)が最も多く、次いで2歳(24.7%)、6箇月～11箇月及び3歳(9.0%)の順で、6箇月～3歳が全体の76.1%を占めた。

(ロ) 流行性耳下腺炎

平成30年は年間報告数127例、年間定点当たり報告数2.95、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.19、前年比0.25であった。

過去10年間の年間定点当たり報告数で最も少なかった。

月別定点当たり報告数では、1月(0.40)、6月(0.35)、5月(0.33)の順に多かった。

年齢階級別では、6歳(17.3%)、次いで5歳及び10～14歳(14.2%)の順であった。

週別定点当たり報告数の推移

年次別年間定点当たり報告数

月別定点当たり報告数

年次別・年齢階級別定点当たり報告数の割合