

# オミクロン株による第6波への備え 私たちにできること ～ 大切な人, 自分のために, ワクチン接種を～



3回目接種では, 1・2回目に接種したワクチンの種類にかかわらず, ファイザー社か武田/モデルナ社のいずれかのワクチンを使用します。

**半数近くの方は交互接種 (1・2回目と異なるワクチンを3回目に接種) になります。**



## 交互接種 の効果と安全性は?

**効果** どちらのワクチンを接種しても**免疫原性 (中和抗体価等) は十分上昇**




**安全性** 副反応は同じ種類でも異なる種類のワクチンを接種しても**2回目接種と同様の症状**

**武田/モデルナ社の3回目は1・2回目の半量。2回目接種と比べ発熱や疲労感等の症状は少ないことが報告されています。** (0.5ml ⇒ 0.25ml)

[3回目接種での抗体の増え方]

1回目	2回目	3回目
ファイザー	+	ファイザー
ファイザー	+	20.0倍
モデルナ	+	モデルナ
モデルナ	+	31.7倍
モデルナ	+	モデルナ
モデルナ	+	10.2倍
ファイザー	+	ファイザー
ファイザー	+	11.5倍

[3回目接種の副反応]



※ 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会第25回資料より  
(資料は3回目もモデルナは0.5mlで接種)

★ ワクチンの効果や安全性に大きな差はありません。ワクチン接種で得た免疫の効果は低下しません。  
タイミングを逃さず, **打てるワクチンを接種すること**をお勧めします。

【別添】