	月11日1 中区(2020年区/小貝區歌和木										向初						
	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
流入下	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	170	240	59	140	190	_	_	_	_	_	_	_	240	59	170
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
	室素含有量	(mg/L)	27	27	9.9	21	25	-	-	_	-	-	-	-	27	9.9	22
	アンモニア性窒素	(mg/L)	16	14	5.0	11	12	_	_	_	ı	ı	_	-	16	5.0	12
		(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	_	_	_	ı	ı	_	1	<0.1	<0.1	< 0.1
水	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	0.6	0.1	0.1	_	_	_	-	-	_	_	0.6	<0.1	0.1
I	有機性窒素	(mg/L)	11	12	4.2	9.7	12.0	_	_	_	_	_	-	_	12	4.2	10
1	りん含有量	(mg/L)	3.0	3.3	0.94	2.5	3.1	_	_	_	_	_	-	_	3.3	0.94	2.6
	オルトりん	(mg/L)	1.4	1.0	0.48	1.0	1.1	_	_	_	_	_	-	_	1.4	0.48	1.0
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	67	63	49	72	67	_	_	_	-	_	_	_	72	49	64
流入下水Ⅱ	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	-	-	-
	室素含有量	(mg/L)	14	13	8.2	12	12	_	_	_			_	_	14	8.2	12
	アンモニア性窒素	(mg/L)	9.5	7.6	3.4	6.2	6.3	_	_	_	_	_	_	_	10	3.4	6.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1		_	_			_	_	0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.3	0.1	0.7	0.2	0.1	_	_	_	_		_	_	0.7	0.1	0.3
	有機性窒素	(mg/L)	5.2	5.6	4.0	6.5	5.9	_	_	_	_		_	_	6.5	4.0	5.5
	りん含有量	(mg/L)	1.4	1.3	1.0	1.7	1.5	_	_	_	_	_	_	_	1.7	1.0	1.4
	オルトりん	(mg/L)	0.56	0.41	0.22	0.38	0.46	_	_	_	_		_	_	0.56	0.22	0.40
		<i>i</i>				1		<u> </u>									
西	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.1	3.1	2.9	3.1	2.4	_	_	_	_	-	_	_	3.1	2.4	2.9
高	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	2.8	2.8	2.6	2.9	2.4	_	_	_	_	_	_	_	2.9	2.4	2.7
瀬川	室素含有量	(mg/L)	7.3	7.1	4.4	6.1	6.2	_	_	_		-	_	_	7.3	4.4	6.3
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	_	_	_	_	_	_	_	0.2	<0.1	<0.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	_	_	_	_	_	_	_	<0.1	<0.1	<0.1
放	硝酸性窒素	(mg/L)	6.4	6.0	4.5	5.1	5.0	_	_	_	_	_	_	_	6.4	4.5	5.4
流	有機性窒素	(mg/L)	0.9	0.6	0.6	0.7	0.8	_	_	_	_	1	_	_	0.9	0.6	0.7
水	りん含有量	(mg/L)	0.22	0.42	0.36	0.16	0.30	_	_	_	_	_	_	_	0.42	0.16	0.30
	オルトりん	(mg/L)	0.15	0.33	0.38	0.12	0.35	_	_	_	_	_	_	_	0.38	0.12	0.27
桂	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.4	3.0	1.9	2.9	2.5	_	_	-	-	-	_	-	3.4	1.9	2.8
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.2	2.9	1.8	2.5	2.3	_	_	_	-	-	_	-	3.2	1.8	2.5
川	窒素含有量	(mg/L)	8.1	7.8	5.0	7.2	6.0	_	_	-	-	-	_	-	8.1	5.0	7.0
放流水 1	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	_	-	-	1	1	_	1	0.1	<0.1	0.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	_	_	_	_	_	_	_	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	7.6	7.0	5.5	6.4	5.4	_	_	_	-	_	_	-	7.6	5.4	6.4
	有機性窒素	(mg/L)	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	_	_	_	_	_	_	_	0.8	0.6	0.7
	りん含有量	(mg/L)	0.44	0.37	0.20	0.25	0.50	_	_	_	_	_	_	_	0.50	0.20	0.36
	オルトりん	(mg/L)	0.40	0.39	0.30	0.19	0.44	_	_	_	_	_	_	_	0.44	0.19	0.36
桂川放流水 2	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.9	2.6	3.8	2.7	2.3	_	-	-	Ī	Ī	-	-	3.9	2.3	2.9
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.8	2.4	2.5	2.3	2.2	_	_	_	-	-	_	-	3.8	2.2	2.5
	窒素含有量	(mg/L)	7.3	7.2	4.8	6.2	5.5	-	_	-	ı	ı	_	ı	7.3	4.8	6.2
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	_	_	_	-	-	_	_	0.1	<0.1	<0.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	_	_	-	-	_	_	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.8	6.5	5.2	5.2	5.2	_	_	_	1	1	_	-	6.8	5.2	5.8
	有機性窒素	(mg/L)	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	_	_	_	ı	ı	_	-	0.9	0.6	0.7
	りん含有量	(mg/L)	1.0	0.84	0.62	0.69	1.00	-	_	_	-	-	_	_	1.0	0.62	0.83
	オルトりん	(mg/L)	1.0	0.82	0.51	0.66	0.80	-	-	-	-	-	_	-	1.0	0.51	0.78
								•									

注1) 硝化脱窒処理過程での硝化細菌の繁殖により、放流水でのBODには硝化に消費される溶存酸素量が含まれます。 そのため有機物指標として、硝化作用を抑制した状態でのBODを炭素系生物化学的酸素要求量もあわせて測定しています。 注2) 高度処理の効果をより正確に評価するため,流入下水,放流水ともに24時間混合採水の試料を用いて測定しています。 そのため,同様にHP上で公開している「放流水の水質結果」とは放流水の値が異なります。